

Nombre: **AUTHORITY 250 SC**

Abril 2024

Teléfonos de emergencia toxicológica:

SAMU: 106

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA SUCURSAL: 421 4811

Teléfonos De Emergencia Química:

CHEMTREC (+ 51) 17071295

Página 1 de 2

FICHA TECNICA

AUTHORITY 250 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

REGISTRÓ PQUA Nro. 1751- SENASA
Titular del Registro: FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin.....125 g/L
Flutriafol.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 litro

GENERALIDADES

Authority 250 SC, con ingredientes activos Azoxystrobin y Flutriafol, pertenece a la familia química de los estrobirulinas y triazoles respectivamente. **Authority 250 SC** tiene acción sistémica, traslaminar y contacto.

Aplicar **Authority 250 SC** cuando no se prevean lluvias, de tal manera que no se produzca lavado del producto y se dé un tiempo seco suficiente para que el producto se adhiera a la planta y pueda generar controles satisfactorios.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C (días)	L.M.R. (ppm)
	N. común.	N científico			
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	7	3 ¹ 0.3 ²
Vid	Oidiosis	<i>Erisiphe necator</i>	0.5	14	2 ¹ 0.8 ²
Arroz	Pudrición de la vaina	<i>Sarocladium oryzae</i>	0,4 – 0,5	28	5 ¹ 1.5 ²
Maíz	Mancha de asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	0.5	7	0.2 ¹ 0.1 ²

*Gasto de agua de 450 L/ha a 850 L/ha para el cultivo de vid.

** Gasto de agua de 300L/ha a 400Lha para el cultivo de maíz.

1. Azoxystrobin
2. Flutriafol

P.C. Período de carencia. **L.M.R.:** Límite máximo de residuos.

Periodo de reingreso: Periodo entre la aplicación y el ingreso al área tratada: 12 horas.

METODOS APLICACIÓN:

Authority 250 SC será usado en el control de podredumbre gris *Botrytis cinérea* en el cultivo de Tomate. Se realiza 1 aplicación durante la floración o formación del fruto, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

Para el control de la Oidiosis en el cultivo de Vid se sugiere realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña: la primera en etapa de desarrollo de brotes y la segunda en la etapa de crecimiento de bayas hasta antes del envero, buscando una excelente cobertura del follaje.

Para el control de la Pudrición de la vaina en el cultivo de Arroz se sugiere realizar una aplicación por campaña al momento del hinchamiento de la panícula o embuchamiento procurando tener una muy buena cobertura del follaje.

Para el control de Mancha de asfalto en Maíz se sugiere realizar una aplicación por campaña, máximo dos al año a partir del periodo vegetativo hasta el proceso de formación de la mazorca procurando una buena cobertura del follaje.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

No se ha demostrado ninguna incompatibilidad con otros productos.

Authority 250 SC no es fitotóxico cuando se emplea bajo la dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin +Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al centro médico y mostrarla etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico: el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral, si la persona esta inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel; retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos,
- En caso de inhalación; trasladar a la persona al aire libre, mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los parpados y los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**